

foliQ®

Bor LS

**LISTOVÉ
HNOJIVO**

ROZTOK

FoliQ® Boron LS je kombinací tří velmi důležitých mikroelementů: boru, manganu a molybdenu. Hnojivo navíc obsahuje dusík.

FoliQ® Boron LS se vyrábí s využitím lignosulfonátu, jedné z nejlepších přírodních komplexních sloučenin živin v hnojivech. Díky tomu je hnojivo velmi účinné i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

APLIKAČNÍ DÁVKY A NAČASOVÁNÍ:

	Obilniny	Řepka olejka	Kukuřice	Řepa	Brambory	Luštěniny	Slunečnice	Ovocné stromy a keře	Zelenina	Ovocné stromy	Okrasné a školkařské plodiny	Produkce sazenic
Doporučený počet ošetření	1 - 2	2 - 3	1 - 2	2 - 3	2 - 3	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3	Hnojení ve formě roztoku		
Doporučená načasování aplikace	Podzim - od fáze 3 listů do období zimního vegetačního klidu. Jaro - od začátku jarní vegetace do konce fáze metání.	Podzim - od fáze 4 listů do období zimního vegetačního klidu. Jaro - od začátku jarní vegetace do začátku kvetení.	Od fáze 4 listů až do doby, kdy je to technicky nemožné vzhledem k výšce rostliny.	Od fáze 3-4 listů do úplného zapojení porostu.	Od vzejtí rostliny do fáze kvetení.	Od fáze 5-6 listů do fáze kvetení.	Od fáze 5 listů do fáze kvetení.	Na dostatečně vyvinutou listovou plochu. Intervence - při zjištění nedostatků opakujte po 14 dnech.	Profylakticky - v období rychlého růstu rostlin. Intervence - při zjištění nedostatků opakujte po 14 dnech.	Připravte 0,2% roztok s vodou, přičemž na jeden strom spotřebujete přibližně 10 l roztoku.	Připravte si 0,1% roztok a aplikujte jej pouze postřikem půdy.	Připravte si 1,0% roztok a ponořte do něj sazenice před výsadbou na pole, abyste stimulovali rychlý vývoj kořenů.
Doporučená dávka (l/ha)	0,3 - 0,5	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 2,0	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0	1,0 - 3,0	roztok 0,2%	roztok 0,1%	roztok 1,0%
Doporučená dávka vody (l/ha)	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300	500 - 1000	300 - 500	0,2l/100l	0,1l/100l	1,0l/100l

Pro podrobnější doporučení kontaktujte společnost AGRII nebo svého distributora AGRII.
Používejte pouze v odůvodněných případech. Nepřekračujte frekvenci aplikace.

Agrii™

OBSAH: 10L
ČISTÁ HMOTNOST: 12,8 kg



Hnojivý výrobek EU
PFC 1(C)(II)(b) Vicesložkové anorganické
hnojivo s mikroživinami
minerální hnojivo s mikroživinami v roztoku
(B) (+8,9) (Mn) (+0,1) (Mo) (+0,4)

foliQ®
Bor LS

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

Pro optimální účinek použijte takové množství vody, aby byla pokryta celá rostlina. Neprovádějte ošetření na ostrém slunečním světle a/nebo při vysokých teplotách. Pokud je to možné, mělo by se ošetření provádět večer nebo brzo ráno, zejména pokud lze podle předpovědi počasi očekávat, že teploty přes den překročí 28 °C. Dodržujte doporučení uvedená v této etiketě týkající se aplikačních dávek a načasování pro jednotlivé plodiny. Hnojivo používejte v plodinách s nedostatkem výše uvedených prvků. Nepřekračujte doporučené dávky.

SLOŽENÍ:

Boroethanolamin (CAS: 26038-87-9),

¹CMC 1: Primární suroviny a směsi,

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:

FoliQ® Bor LS lze míchat s většinou přípravků na ochranu rostlin. DŮLEŽITÉ: Před použitím důkladně protřepejte! Při prvním použití TM směsí se doporučuje provést zkušební rozmíchání v malém množství vody. Při přípravě aplikační kapaliny: 1) naplňte nádrž postřikovače vodou na 50-70 % stanoveného objemu a zapněte míchací zařízení, 2) přidejte přípravky na úpravu vody, 3) přidejte listová hnojiva - **FoliQ® Bor LS**, 4) přidejte přípravky na ochranu rostlin podle pořadí doporučeného výrobcem, 5) přidejte adjuvanty, 6) doplňte vodu do plného objemu nádrže, 7) po ukončení ošetření postřikovač umyjte podle doporučení výrobce přípravku na ochranu rostlin.

MÍCHÁNÍ S JINÝMI PRODUKTY

Hnojivo **FoliQ® Boron LS** vykazuje fyzikální a chemickou kompatibilitu pro míchání s mnoha přípravky na ochranu rostlin a s na trhu dostupnými přípravky s mikroelementy. Aby byla zajištěna stabilita směsí, mělo by se pH roztoku pohybovat v rozmezí 4,0 – 8,0. Vzhledem k nemožnosti předvídat všechny okolnosti, jako je kvalita vody použité k přípravě aplikační kapaliny, druh a množství přidávaných přípravků na ochranu rostlin, jakož i složení nově registrovaných typů přípravků na ochranu rostlin, se u neodzkoušených kombinací doporučuje provést zkušební smíchání složek v samostatné nádobě v malém objemu roztoku a vyčkat, zda se neobjeví nežádoucí reakce. Biologická kompatibilita se může lišit v závislosti na vnějších podmínkách v době ošetření, stavu a vývojem stádiu rostlin a na dalších přípravcích použitých v TM směsí. Z tohoto důvodu neexistují žádná doporučení týkající se biologické kompatibility s jinými produkty a bezpečnosti směsí pro plodiny. Vždy si přečtěte návod k použití vydaný výrobcem každého přípravku, který má být při ošetření použit. V případě pochybností se obraťte na výrobce přípravku.

SKLADOVÁNÍ

Hnojivo skladujte a přepravujte v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Vyhněte se náhlým změnám teploty. Při skladování za nevhodných podmínek (např. při teplotách pod +5 °C) může dojít k částečnému vyschnutí nebo změně barvy hnojiva. Vzniklé krystaly se po zředění vodou opět rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se bez zbytku vystřikají na ošetřovanou plochu. Přípravek nevylévejte do kanalizace. Zákaz stohování palet.

Živiny:	% m/m	g/l
Bór (B) [^] (ve formě boroethanolaminu)	8,9	114,0
Mangan (Mn) [^] LS	0,1	1,3
Molybden (Mo) [^] (ve formě molybdenanu sodného)	0,4	5,1

Další informace: hnojivo obsahuje Celkový dusík (N) 3,8%

[^] zcela rozpustný ve vodě

LS – komplexováno liginosulfonáty

Stabilita komplexované frakce v rozmezí pH od 3 do 9.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omýjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

UFI: 2V00-00J8-X005-F0EJ



Agrii

Výrobce:

Agrii Polaka Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
tel.: (0 61) 842 94 66, fax: (0 61) 842 94 67
www.agrii.pl

OBSAH: 10L

ČISTÁ HMOTNOST: 12,8 kg

Pouze pro profesionální uživatele.

Datum výroby a číslo šarže na obalu.

Skladovatelnost - 3 roky od data výroby