

Výrobce:
SYNTHOS AGRO Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
tel.: +48 33 847 47 77,
e-mail: rejestracja@synthosgroup.com



KUPROSAL 25

Jednosložkové anorganické hnojivo se stopovými živinami

VÝŽIVNÉ LÁTKY (%/hm):

25% Celková měď (Cu)

Forma: kapalina

Složení:

Chlorid-trihydroxid diměďnatý¹ (CAS: 1332-65-6); propan-1,-

2-diol¹ (CAS: 57-55-6); kyselina naftalensulfonová, polymer s

formaldehydem, sodná sůl¹ (CAS: 9084-06-4)

¹KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu

Používání hnojiva je bezpečné za podmínek uvedených v návodu

Návod k použití hnojiva:

Minerální tekuté hnojivo, obsahující měď (Cu) v podobě oxichloridu měďnatého, určené ke hnojení na list. Používá se na hnojení rostlin pěstovaných na polích, v sadech a zahradách. Hnojivo se doporučuje používat během vegetačního období, zejména v době zvýšených nároků rostlin na měď. Hnojivo aplikujte na suché listy. Nepoužívejte před očekávaným deštěm.

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi.

Použití:

- jabloně a hrušně: 1,5 l v 500-750 l vody/ha - použijte po zahájení jarní vegetace do začátku kvetení 1-2 aplikace a po sklizni ovoce.
- třešně a višně: 3 l v 500-750 l vody/ha po zahájení vegetace a po sklizni ovoce nebo v období kvetení 1,5 l v 500-750 l vody/ha.
- slivoně: 3 l v 500-700 l vody/ha po zahájení vegetace a 2-3 l v 500-700 l vody/ha v období opadání listů.
- broskve: 5-7 l/ha v 500-700 l vody velmi brzy na jaře a na podzim po opadnutí listů.
- rajče: 2,0-2,5 l/ha v 700 l vody, 14 dnů po zasazení sazenic, následně 1-3 aplikace v časových odstupech 14 dnů.
- okurka: 2,0-2,5 l/ha v 700 l vody, když je na hlavním výhonku otevřený druhý květ, až do fáze kdy osmý plod na hlavním výhonku získá typický tvar a velikost pro sklizeň. Používejte 1-3 aplikace v časových odstupech 14 dnů.
- réva vinná: 3,0 l/ha v 500-900 l vody, před kvetením, hned po kvetení, v 3. dekádě července, kdy plody dosáhnou velikosti hrášku. Používejte 1-3 aplikace během sezóny v časových odstupech 10-14 dnů.

synthos
AGRO

- rybíz: 3,0 l/ha v 700 l vody, přímo před kvetením, hned po kvetení až do sklizně. Používejte 1-3 aplikace během sezóny v časových odstupech 10-14 dnů
- vlašský ořech, lískový ořech: 2-3,0 l/ha v 1000 l vody, od praskání pupenu do kvetení samičích květů. Používejte 1-2 aplikace v časových odstupech 7-14 dnů.
- fazol: 2,0-2,5 l/ha v 600-800 l vody v době kvetení a po kvetení. Používejte 1-2 aplikace během sezóny v časových odstupech 7-10 dnů
- ostatní plodiny: 0,5-1 l/ha v 500 l vody, v době intenzivního růstu
- Ozimé a jarní obiloviny: 0,2-0,5 l/ha v 100-400 l vody, během vegetace, max. do 4 týdnů před sklizní
- Kukuřice, luskoviny: 0,7-1,4 l/ha v 100-400 l vody během vegetace, max. do 4 týdnů před sklizní,
- Řepka 0,4-2,2 l/ha v 100-400 l vody, během vegetace, max. do 4 týdnů před sklizní,
- Brambory 1,7-2,5 l/ha v 100-400 l vody, během vegetace až do doby posledního postřiku
- Cukrová řepa 1,4-2,7 l/ha v 100-400 l vody, během vegetace až do doby posledního postřiku

Navrhovaná doporučení mají obecnou povahu. Před použitím je nutné zohlednit potřeby jednotlivých plodin a podmínky pěstování.

Před vytvořením směsi s jinými hnojivy nebo přípravky na ochranu rostlin v nádrži postřikovače je nutné vytvořit zkušební směs v malém objemu vody.

Upřesnění dávek mědi ke konkrétním plodinám a jejich případné dělení doporučujeme na základě rozborů půdy, popř. podle výživového stavu rostlin.

Dodržujte všechny pokyny a kontraindikace uvedené na etiketě – návodu k obsluze přípravku používaného spolu s hnojivem.

Příprava postřikové kapaliny:

Před použitím dobře protřepat. Před přípravou postřikové kapaliny je nutné přesně stanovit její nezbytné množství. Odměřené množství hnojiva smíchejte ve zvláštní nádobě s malým množstvím vody, následně nalijte přes síto do nádrže postřikovače částečně naplněné vodou (se zapnutým míchadlem) a doplňte vodou. Postřikujte při zapnutém míchání. Prázdné obaly vypláchněte třikrát vodou, a oplachovou vodu nalijte do nádoby s postřikovou kapalinou.

Kontaktujte společnost Synthos Agro Sp. z o.o. nebo kontaktujte svého distributora pro konkrétnější doporučení.

Používejte pouze v odůvodněných případech. Nepřekračujte dávku.

Návod na přepravu a skladování:

- Chraňte před působením přímého slunečního záření
- Chraňte před vlhkem.
- Počet vrstev při stohování ve skladu – max. 3
- Počet vrstev během přepravy – max. 3
- Hnojivo skladujte při teplotě od 0°C do 30°C

Hnojivo skladujte pouze v původních, těsně uzavřených obalech, při teplotě 0 až 30°C, ve vhodné vzdálenosti od zdrojů tepla, potravin, krmiv, potravinářských nádob, v místech zajištěných proti přístupu neoprávněných osob, zejména dětí.

Klasifikace směsi:

PRVKY OZNAČENÍ

Označení v souladu s Nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP):



Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 208 - Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Věty určující podmínky pro bezpečné použití:

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách

P301 + P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P391 - Uniklý produkt seberte.

P501 - Odstraňte obsah a obal podle místních.

KÓD UFI: RW10-20UK-E00P-DJJC

Bezpečnostní opatření

Zabraňte kontaktu produktu s látkami se silně kyselými nebo zásaditými vlastnostmi.

Používejte pouze v případech, kdy je to nutné – při zjištění nedostatku mědi v rostlinách. Existuje možnost vzniku fytotoxických účinků, zejména v období chladného a vlhkého počasí a u některých odrůd ovocných stromů, vinné révy a ostatních rostlin.

Nepoužívejte během dne v místech, kde se vyskytují včely.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte obal s hnojivem před poškozením.

Hnojivo může být zdraví škodlivé při požití.

Hnojivo může vyvolat alergickou kožní reakci.

Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Urgentně vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest a očí.

Přípravek nebezpečný pro životní prostředí.

V případě úniku, pokud je to možné, rozlitou kapalinu odčerpejte do nádoby. Zbytek posypte pískem před zaschnutím, následně seberte do prázdného obalu a likvidujte podle pokynů odborníků.

V případě rozsypání hnojiva, jej seberte a umístěte do prázdného obalu.

Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování.

Maximální aplikační dávka 28 kg Cu/ha na dobu sedmi let (tj. v průměru 4 kg/ha/rok), na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi.

Doba použitelnosti: **2 roky od data výroby (na obalu)**

Šarže: **na obalu**